Das kleine 1x1 der GIST...

(Gastrointestinale Stromatumoren)

Markus Wartenberg

-
- 26.05. 17:00 Die lokalisierte GIST-Erkrankung
PD Dr. Peter Reichardt
- 02.06. 17:00 Neue GIST-Therapien/Optionen
Prof. Dr. Sebastian Bauer
- 09.06. 16:00 Lokale Verfahren bei GIST-Progress
Prof. Dr. Peter Hohenberger
- 18.06. 17:00 GIST-Mutationsanalyse et al
Prof. Dr. Eva Wardelmann

- 1** GIST: Einleitung und Überblick
- 2** Entstehung/Ursachen
- 3** Zu den medikamentösen Therapien
- 4** Drei Stadien: Lokalisiert – Metastasiert – Progress

1

GIST: Einleitung und Überblick

2

Entstehung/Ursachen

3

Zu den medikamentösen Therapien

4

Drei Stadien: Lokalisiert – Metastasiert – Progress

GIST: Gastrointestinale Stromatumoren

- Erst seit 1998 eindeutig diagnostizierbar
Entdeckung der Mutation im KIT-Gen
durch Prof. Seiichi Hirota
- Im gesamten Magen-Darm-Trakt -
Organwand (daher gastrointestinal)
- Bleiben in frühen Stadien meist
unbemerkt = schleichende Entwicklung
- Zu Beginn: Mutation im KIT-Gen
Heute > 20 verschiedene Mutationen

GIST: Makroskopie

GIST: Mikroskopie (Zelltypen)

Spindelzellig

Epitheloid

Mischzellig

<u>spindel</u>		<u>epith./misch.</u>
82,1%	KIT	17,9%
8,3%	PDGFR	91,7%

- **Gruppe der Sarkome (Weichgewebesarkome):
Seltene Krebsart im Binde-/Stützgewebe
(Knochen, Muskeln)**
- **GIST:**
 - Nur 0,2% aller GI-Tumoren
 - Häufigstes Sarkom des GI-Traktes > 80%
- **Andere (häufigere) Krebsarten wie z.B. Karzinome
entstehen aus Epithelzellen (drüsige Organe)**
- **Wenige Spezialisten bei Sarkomen
(noch weniger haben Erfahrung mit GIST) – daher:
Interdisziplinäre Sarkom-Zentren**

Symptome

- **Wenige Symptome > daher häufig schon sehr groß**
- **Ca. 25 – 33% asymptomatisch = Entdeckung bei:
Notfalloperation, Routineeingriffen/-untersuchungen**
- **Abhängig von der Tumorgröße und der Lokalisation**
- **Symptome im Überblick (je nach Tumorlokalisierung):**
 - Unspezifischer Schmerz (u.U. Art Seitenstechen) 50 – 70%
 - Unwohlsein im Bauchraum
 - Völlegefühl
 - Verstopfung
 - Fühlbare Masse im Bauchraum
 - Übelkeit
 - Blutungen (evtl. Anämie = Blutarmut) 20 – 50%
 - GIST in der Speiseröhre: Schluckstörungen

- 1** GIST: Einleitung und Überblick
- 2** Entstehung/Ursachen
- 3** Zu den medikamentösen Therapien
- 4** Drei Stadien: Lokalisiert – Metastasiert – Progress

Entstehungsort (GIST-Zellen)

- Früher: Aus den weichen Muskelzellen
- 1998: GIST und Kit-Protein
- Heute: „Interstitiellen Zellen von Cajal“
oder deren Vorläuferzellen

- Cajal-Zellen = Schrittmacher-Zellen (pacemaker-cells): Stimulieren die Bewegung des GI-Traktes (Peristaltik)
- Erstbeschreibung 1893 durch Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)

GIST entsteht in den äußeren Bereichen der Magenwand

Magenkrebs entsteht in den inneren Bereichen der Magenwand

Primärtumoren

- **Lokalisation:**
 - 50 - 60% im Magen
 - 20 - 30% im Dünndarm
 - 5 - 10% im Enddarm/Rektum
 - < 1% Speiseröhre

- **Primäre Metastasierung:**

Früher	ca.	50%
Heute	15 -	47%

(Heute früher diagnostiziert!)

Entstehung von Krebs

Erblich

Umweltbedingt

Entstehung von Krebs

Entstehung von Krebs

Entstehung von Krebs: Analgoien...

Beim Kopieren von Bauplänen kommt es zu Fehlern, die zu fehlerhaften Bauteilen/Produkten führen...

Beim Kopieren von Rezeptbüchern kommt es zu Fehlern, die zu ungenießbaren Gerichten führen...

Ursachen

- Auslöser bzw. externe Ursachen nicht bekannt
- Ungeklärt: Rolle der „Micro-GISTs“ (22 – 35%)
- Fehlerhaftes Gen, das zur Veränderung eines Signalempfängers (Rezeptor) führt
- Bsp. c-Kit-Rezeptor mit Enzym = Tyrosinkinase (Art Antennen in der Zellwand)
- Dauerhaft aktiviert = unkontrolliertes Zellwachstum
- Weitere Rezeptorfamilie: PDGFR-alpha
- Wichtige Kriterien für GIST:
 - Die Lokalisation des Tumors
 - Positives Kit (CD 117) >>> Doch Ausnahmen!

Ursachen

Schematische Zelle

C-Kit: Rezeptor Tyrosinkinase (Antenne)

ZELLÄUSSERES

Ligandenbindende
Domain

Zellmembran
Juxtamembranöse
Domain

ZELLINNERES (Zytc

Hotspot-Regionen von GIST-Mutationen (Primär-Mutationen)

GIST

C-Kit (ca. 80 - 82%)

Exon 9	10%
Exon 11	60%
Exon 13	1-2%
Exon 17	1-2%

Aber auch ca. 10 – 12%:
Wild Typ – ohne Mutation
in KIT oder PDGFR-alpha

PDGFR-alpha (ca. 5 - 8%)

(überwiegend im Magen)

Exon 12	1%
Exon 14	1%
Exon 18	6%

Mutationsanalyse (Exon-Bestimmung)

- **Primär-Mutation! Exons!**
- **Wird heute in DE/AT/CH (+/- 90%) standardmäßig durchgeführt!**
- **Inzwischen: Viele Labors mit Expertise**
- **Dauert ca. 7 Tage bis mehrere Wochen**
- **Wichtig für:**
 - **Prognostische Einschätzung**
 - **Wahl der Therapie-/Studienoption, Therapieansprechen**
 - **Progress-/Resistenzforschung (Neu-/Zweitmutation)**
- **Therapie-relevant z.B. für**
 - Exon 11**
 - Exon 9**
 - Exon 18 D842V**
 - Non KIT-/PDGFR**

Diagnostik

Tabelle 3: Diagnostik und Staging

Untersuchung	Anmerkung
Körperliche Untersuchung	
Labor (Blut)	Zur Beurteilung der Organfunktionen (Blutbild, Leber- und Nierenfunktionsparameter, Gerinnung, TSH)
Endoskopie, Endosonographie	Diagnostisch zur Klärung des Ausbreitungsmusters und histologischen Sicherung
Computertomographie Thorax, Abdomen, Becken mit Kontrastmittel	Erhebung intra-/extraabdomineller Tumormanifestationen Vor geplanter Resektion zu Gefäßdarstellung
PET-CT	In Einzelfällen zur Diagnosesicherung und Staging
Histologie	Bei inoperablen Tumoren vor Therapieeinleitung Bei operablen, bei unklaren Befunden, Cave intraabdominelle Tumordissemination
Molekulargenetik	<i>KIT</i> - bzw. <i>PDGFRA</i> -Mutationsstatus bei Erstdiagnose, im Krankheitsverlauf bei Therapieresistenzen

Quelle: Onkopedia Leitlinien GIST April 2019

1

GIST: Einleitung und Überblick

2

Entstehung/Ursachen

3

Zu den medikamentösen Therapien

4

Drei Stadien: Lokalisiert – Metastasiert – Progress

Überblick: Zugelassene Target-Therapien bei GIST

Forschungscode:

STI-571

Wirkstoff:

Imatinib (Mesylate)

Produktname:

Glivec® / Gleevec™

Hersteller:

Novartis

Zulassungen:

CML + div. Rare Cancers
Adjuvante GIST-Therapie
1.-Linie Metast. GIST

Tyrosinkinase-

Inhibitor – Targets:

KIT, PDGFR, Bcr-Abl

Darreichung:

Oral
100mg, 400mg
Tabletten

Therapie:

Dauer, tägl.

Standarddosierung:

400mg/Tag od. 800mg/Tag

Dosierung in der

400mg Mindest-Dosis

klin. Praxis:

800mg Exon 9

Überblick: Zugelassene Target-Therapien bei GIST

Forschungscode:

Wirkstoff:

Produktname:

Hersteller:

Zulassungen:

Tyrosinkinase-
Inhibitor – Targets:

Darreichung:

Therapie:

Standarddosierung:

Dosierung in der
klin. Praxis:

SU 11248

Sunitinib (Malate)

Sutent®

Pfizer

Metast. Nierenkrebs (mRCC)

Fortge. NET des Pankreas

2.-Linie Metast. GIST

KIT, PDGFR, VEGF,

FLT, RET, CSF

Oral

12,5mg, 25mg, 50mg

Kapseln

Zyklus – 6 Wo.

(4 Wo. Ther. – 2 Wo. Pau.)

50mg/Tag für 4 Wo.

37,5mg/Tag durchgehend

Individuelle Dosierung

Überblick: Zugelassene Target-Therapien bei GIST

Forschungscode:

Wirkstoff:

Produktname:

Hersteller:

Zulassungen:

Tyrosinkinase-
Inhibitor – Targets:

Darreichung:

Therapie:

Standarddosierung:

Dosierung in der
klin. Praxis:

BAY 73-4506

Regorafenib

Stivarga®

Bayer

Metast. Darmkrebs (mCRC)

3.-Linie Metast. GIST

RET, VEGFR1-3, KIT,
PDGFRA+B, FGFR1-3, TIE2,
DDR2, TrkA, Eph2A, RAF-1,
BRAF, SAPK2, PTK5, Abl

Oral

40mg

Tabletten

Zyklus – 28 Tage – 4 Wo.

(21 Tage Ther. – 7 Tage Pau.)

160mg/Tag für 21 Tage

Dosis-Reduktionen (120/80)

Individuelle Dosierung

Imatinib (Glivec®): Nebenwirkungen...

Die häufigsten Nebenwirkungen¹

■ Abdominalschmerzen	■ Dyspepsie	■ Muskelspasmen/
Muskelkrämpfe	■ Neutrozytopenie
■ Anämie	■ Erbrechen	■ Muskel- und Gelenk-
schmerzen einschließ-
lich Myalgie	■ Periorbitale Ödeme
■ Arthralgie	■ Flüssigkeitsretention	■ Müdigkeit	■ Periphere Ödeme
■ Dermatitis/Ekzem/
Hautausschläge	■ Gewichtszunahme		■ Thrombozytopenie
■ Diarrhoe	■ Knochenschmerzen		■ Übelkeit
	■ Kopfschmerzen		

- Die Häufigkeit und Schwere der Nebenwirkungen ist von der Dosierung und dem Stadium der Erkrankung abhängig.¹
- Nebenwirkungen führen bei nur 4% der Patienten aufgrund von Arzneimittel-bedingten Nebenwirkungen zu einer Therapie-Unterbrechung.

Die meisten Nebenwirkungen sind kontrollier- und behandelbar.²

Imatinib (Glivec®): Mögliche Interaktionen...

Mögliche Interaktionen mit anderen Arzneimitteln¹

GLIVEC® wird in der Leber über das CYP3A4-Enzym metabolisiert und hemmt CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4/5

Arzneimittel, die den Plasmaspiegel von GLIVEC® erhöhen können:

- Clarithromycin
- Erythromycin
- Itraconazol
- Ketoconazol

Arzneimittel, die den Plasmaspiegel von GLIVEC® senken können:

- Carbamazepin
- Dexamethason
- Fosphenytoin
- Johanniskraut
- Oxcarbazepin
- Phenobarbital
- Phenytoin
- Primidon
- Rifampicin

Arzneimittel, deren Plasmaspiegel durch GLIVEC® verändert werden können:

■ Ciclosporin	■ Paracetamol
■ Dihydropyridin (Ca ²⁺ + Kanalblocker)	■ Pimozid
■ HMG-CoA-Reduktase-Inhibitoren (Statine)	■ Simvastatin
■ Levothyroxin	■ Triazol-Benzodiazepine
■ Metoprolol	■ Warfarin und andere Cumarin-Derivate

- Grapefruitsaft und andere Lebensmittel, die nachweislich CYP3A4 hemmen, sind zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, GLIVEC® zusammen mit einer Mahlzeit und einem Glas Wasser einzunehmen, um das Risiko von gastrointestinalen Beschwerden zu minimieren.¹
- Weitere Informationen finden Sie unter: www.torsades.org und www.lh-gist.org/d/2422

Arzt-Patienten-Kommunikation

NEW

USA: Exon 18 D842V: Kommende Target-Therapie...

Wirkstoff:	Avapritinib
Produktname:	Ayvakit™
Hersteller:	Blueprint Medicines
Zulassungen:	In USA, bei GIST, Exon 18 – D842V
Targets:	PDGFRA Exon 18 D842V
Darreichung:	Oral = 100mg, 200mg, 300mg Tabletten
Therapie:	300mg täglich als Dauer-Therapie
Dosis-Reduktionen:	200mg oder 100mg (indiv. Dosierung)

NEW

USA: Viert-Linie: Kommende Target-Therapie...

Wirkstoff:	Ripretinib
Produktname:	Qinlock™
Hersteller:	Deciphera
Zulassung:	In USA, bei GIST, in der Viert-Linie
Targets:	KIT, PDGFR alpha, PDGFR beta, KDR, cFMS
Darreichung:	Oral = 50mg Tabletten, weißlich, oval
Therapie:	150mg täglich als Dauer-Therapie
Dosis-Reduktionen:	100mg oder individuelle Dosierung

deciphera

FDA Approves First Drug for Fourth-Line Treatment of Advanced Gastrointestinal Stromal Tumors

QINLOCK™ NOW APPROVED
(ripertinib) 50mg tablets

1

GIST: Einleitung und Überblick

2

Entstehung/Ursachen

3

Zu den medikamentösen Therapien

4

Drei Stadien: Lokalisiert – Metastasiert – Progress

GISTs sind unterschiedlich...

- Alter und Co-Erkrankungen
 - Stufe/Phase der Erkrankung
 - TumorgroÙe, Tumorlast (Tumormasse)
 - Lokalisation
 - Mitose- oder Zellteilungsrate
 - Primär-Mutation (KIT, PDGFRA, Wild Type...)
 - Metastasen (Zahl, Lokalisation)
 - Sekundär-Mutationen
 - Typ der Resistenz?
 - Rolle des Immunsystems?
 - Andere Einflüsse, die wir noch gar nicht kennen!?
-
- Zugang/Erstattung Therapien
 - Behandlungsqualität (z.B. Tumor Ruptur) > GIST-/Sarkom-Zentrum
 - Therapie- und Nebenwirkungsmanagement

GISTs sind unterschiedlich...

66,0%	KIT Exon 11 (Diverse)
8,0%	KIT Exon 9
2,0%	KIT Exon 13
1,0%	KIT Exon 17
0,1%	KIT Exon 8
5,0%	PDGFR Exon 18 D842V
3,0%	PDGFR Exon 18 Andere
2,0%	PDGFR Exon 12
1,0%	PDGFR Exon 14
9,0%	SDH Mutation (A/B/C/D)
1,5%	BRAF V600E
1,0%	SDHC Epimutation
1,0%	Unklassifiziert
0,1%	RAS-Mutation
0,1%	NF1-bezogen
0,1%	RTK Translokation

Quelle: CTOS 2019
Kohorte Heinrich/Corless

GISTs sind unterschiedlich...

Lokal begrenzter,
operabler
Primärtumor
(keine Metastasen)

Lokal begrenzter, operabler Primärtumor (keine Metastasen)

Therapie der ersten Wahl: Chirurgie!

Evtl: Adjuvante (vorsorgliche) Therapie...

- Erfolgreiche operative Entfernung des Tumors
- Relevantes Rückfallrisiko nach Operation
- Wirksame Therapieoption vorhanden: Imatinib
- 3 Jahre Imatinib adjuvant – bei deutl. Rückfallrisiko
Behandlung > 3 Jahre – derzeit unklar!

Speziell = Schwierige Lokalisation / umfangreiche OP???

Dann >>> 6 – 12 Monate neoadjuvante Therapie mit Imatinib

Ziel: Verkleinerung des Tumors für bessere OP!

Risikoklassifizierung (nach Miettinen/Lasota 2006)

Tumorparameter		Risiko für Krankheitsprogress (%)			
Anzahl Mitosen	Tumorgröße	Magen	Duodenum	Dünndarm	Rektum
≤ 5/50 HPF	≤ 2 cm	0	0	0	0
≤ 5/50 HPF	> 2 ≤ 5 cm	1,9 sehr niedrig	8,3 niedrig	4,3 niedrig	8,5 niedrig
≤ 5/50 HPF	> 5 ≤ 10 cm	3,6 niedrig	34 hoch	24 moderat	57* hoch
≤ 5/50 HPF	> 10 cm	12 moderat		52 hoch	
> 5/50 HPF	≤ 2 cm	0*	#	50* hoch	54 hoch
> 5/50 HPF	> 2 ≤ 5 cm	16 moderat	50 hoch	73 hoch	52 hoch
> 5/50 HPF	> 5 ≤ 10 cm	55 hoch		85 hoch	
> 5/50 HPF	> 10 cm	86 hoch	86 hoch	90 hoch	71 hoch

Lokal begrenzter, operabler Primärtumor (keine Metastasen)

Therapie der ersten Wahl: Chirurgie!

Evtl: Adjuvante (vorsorgliche) Therapie...

- Erfolgreiche operative Entfernung des Tumors
- Relevantes Rückfallrisiko nach Operation
- Wirksame Therapieoption vorhanden: Imatinib
- 3 Jahre Imatinib adjuvant – bei deutl. Rückfallrisiko
Behandlung > 3 Jahre – derzeit unklar!

Speziell = Schwierige Lokalisation / umfangreiche OP???

Dann >>> 6 – 12 Monate neoadjuvante Therapie mit Imatinib

Ziel: Verkleinerung des Tumors für bessere OP!

Inoperabler /
metastasierter
(fortgeschrittener)
GIST

Metastasen

- Tumorzellen des Primärtumors – über Blutstrom in andere Organe
- Bilden dort weitere „Tochtergeschwülste“
- Überwiegend Leber oder Bauchraum
- Metastasen eines GIST in der Leber = GIST – kein Leberkrebs!!!

<u>Intrabdominell</u>	<u>~ 90%</u>
Leber	50-65%
Peritoneum (+/- Leber)	20-35%
Lymphknoten	4- 6%
<u>Extraabdominell</u>	<u>~ 10%</u>
Knochen	6%
Lunge	2%
Kutan/subkutan	< 1%

Metastasierter GIST: Imatinib ist Standard!!!

Forschungscode:

STI-571

Wirkstoff:

Imatinib (Mesylate)

Produktname:

Glivec® / Gleevec™

Hersteller:

Novartis

Zulassungen:

CML + div. Rare Cancers
Adjuvante GIST-Therapie
1.-Linie Metast. GIST

Tyrosinkinase-

Inhibitor – Targets:

KIT, PDGFR, Bcr-Abl

Darreichung:

Oral
100mg, 400mg
Tabletten

Therapie:

Dauer, tägl.

Standarddosierung:

400mg/Tag od. 800mg/Tag

Dosierung in der

400mg Mindest-Dosis

klin. Praxis:

800mg Exon 9

**Tägliche Dauer-Therapie –
nicht absetzen!**

**Gutes Therapie- und Newi-Mgmt.:
Möglichst lange profitieren...**

**Chirurgie kontrollierter Metasasen
= schlechte Evidenz-Lage
= Einzelfall-Entscheidung**

Progression:
Fortschreiten der
metastasierten
Erkrankung unter
medikamentöser
Therapie

Imatinib-Resistenzen

- Initial: Nur wenige Patienten tolerieren Imatinib gar nicht
- Nach 2- 3 Jahren können sich - bei zunächst erfolgreich behandelten Patienten - teilweise oder völlige Resistenzen bilden
- Aber auch: 10% der Patienten mit metast. GIST, die seit 15 – 18 Jahren unter Imatinib stabil sind...
(Leider wissen wir nicht, welche Patienten dies – warum – sind!)

Formen des Progresses

Bei Diagnose
Metast. GIST

Stabile
Erkrankung

Läsion in
einer Läsion

Lokaler/fokaler
Progress

*Läsion wächst
Dichte nimmt zu*

Neue
Läsion

Systemischer
Progress

Formen des Progresses:

- **Lokaler (fokaler) Progress:**
Fortschreiten der Erkrankung
an einzelnen Stellen
- **Systemischer Progress:**
Fortschreiten der Erkrankung
insgesamt

Prüfung/Verifizierung eines Progresses

Handelt es sich wirklich um einen Progress???

- Adhärenz (Therapie-Treue)?
- Progression bestätigt?
- Histologie bestätigt?
- Einflussfaktoren z.B.
Komplementäre Therapien?
- Symptome vorhanden?
- Unmittelbar drohende Gefahr?

Prüfung/Verifizierung eines Progresses

Bei Progress >>> NICHT ANGEBRACHT:

- Kopflose/operative Hektik
- Druck durch den behandelnden Arzt
- In der Regel: Zeit für eine Zweitmeinung...

- Je nach individueller „Patienten-Situation“ - Option:
Treatment Beyond Progression!
„Eng beobachten und abwarten – vor Therapie-Wechsel...“ (= Spiel auf Zeit!)

Progress(ion)

1. MEDIKAMENTÖSE STANDARD-OPTIONEN?

IMATINIB-ERHÖHUNG (?)

SUNITINIB (Sutent®)

REGORAFENIB (Stivarga®)

2. WEITERE MEDIKAMENTÖSE OPTIONEN?

OFF LABEL USE

KLINISCHE STUDIE MIT NEUEN SUBSTANZEN

3. LOKALE OPTIONEN/MASSNAHMEN?

RESEKTION, RFA, LITT, & CO.

Behandlung durch GIST-Experten

- **WICHTIG: Einzelfall-Entscheidungen >>>**

sehr individuell je Patient! Rationale/Sinnhaftigkeit?

- Off Label Use – wenn möglich (Experten-Antrag bei Krankenkasse)

Nilotinib (Tasigna®, Novartis)

Sorafenib (Nexavar®, Bayer)

Pazopanib (Votrient®, GSK>Novartis)

Everolimus (Afinitor®, Novartis)

Dasatinib (Sprycel®, BMS)

Ponatinib (Iclusig®, Takeda/Ariad/Incyte)

ODER

- Klinische Studie / Programme mit „potentieller“ neuer Substanz verfügbar?

Ripretinib DCC-2618 (Deciphera)

- Letzte Option: Zurück auf Imatinib (Glivec®)

WICHTIG: Keine Experimente mit „Chemotherapien“

Wichtigstes Ziel:

Sollte nur eine Läsion „progredient“ sein:
Therapie solange wie möglich beibehalten!

Heißt, wenn möglich:

Isolierte Läsion entfernen –
Therapie (Medikament) beibehalten!

Lokale Optionen/Maßnahmen

- Operation/Resektion
- „Verkochen“ einzelner Metastasen in der Leber
 - RFA Radio-Frequenz-Ablation
 - 3D-gesteuerte RFA – selten z.B. in Innsbruck
 - LITT (Laser indizierte Thermotherapie)
- „Abtöten“ einzelner Metastasen in der Leber
Kryoablation (kaum Erfahrungen/Daten bei GIST)
- Interne Bestrahlung durch SIRT (Kügelchen)
(Selektive Interne Radiotherapie) mit SIR-Spheres® Mikrosphären
- Chemoembolisation
- Extrem selten = Knochenmets. >>> Bestrahlung

Messer/Laser

Hitze

Hitze

Hitze

Kälte

Strahlung

Zytostatika

Strahlung

**Herzlichen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!**