Chirurgische Therapie von GIST

Univ.-Prof. Dr. med. Jens Jakob
Schwerpunktleiter Sarkomchirurgie
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Kinderchirurgie
Universitätsmedizin Göttingen

... entfernen Sie den GIST..

vollständig

ohne Ruptur

möglichst mit
Sicherheitsabstand

Eine Tumorruptur verschlechtert die Prognose

Eine Ruptur ist definiert durch eine grobe Verletzung der Tumoroberfläche

- Spontane oder intraoperative Perforation/Ruptur
- Fragmentierte Resektion
- Inzisionsbiopsie

Stanzbiopsie mit Coaxialnadel = mikroskopische Verletzung der Tumoroberfläche ≠ Ruptur

Fig. 2. Recurrence-free survival of patients who either did or did not have a diagnostic transabdominal needle biopsy performed prior to surgery and adjuvant imatinib. HR, hazard ratio.

Bildgebung und Biopsie ermöglichen die Therapie- und Operationsplanung

- Rektum-GIST, 9cm
- Unmittelbare Nähe zum Schließmuskel
- Sensitive c-kit Mutation

- **Organerhalt?**
- **Vollständige Resektion?**
- **Sicherheitsabstand?**

Zwei Beispiele Magen-GIST

Biopsie – Vollständige Resektion? – Organerhalt? - Sicherheitsabstand? - R-Status?

Eine R0 Resektion mit Sicherheitsabstand hat die geringste Rückfallrate

Große GIST erlauben häufig keinen Sicherheitsabstand und haben per se ein hohes Rückfallrisiko, es besteht wenig Unterschied zwischen R0 und R1 Resektion

Sites of First Recorded Recurrence by Margin Status

Recurrence	Resection Margin	
	R0, n (%)	R1, n (%)
Local	8 (4)	4 (16)
Regional	86 (48)	13 (52)
Distant	87 (48)	8 (32)

J Am Coll Surg. 2012 July ; 215(1): 53–59. doi:10.1016/j.jamcollsurg.2012.05.008.

Laparoskopie und Robotik erlauben ebenso vollständige Resektionen mit Sicherheitsabstand

Endoskopische Techniken können weite Sicherheitsabstände wahrscheinlich nicht gewährleisten

Bei GIST mit Imatinib-sensitiver c-kit/PDGFR Mutation kann ein Downsizing durch präoperative Therapie den Sicherheitsabstand bzw. die Resektabilität verbessern

S3 LL adulte Weichgewebesarkome

(Veröffentlichung erwartet im Herbst)

Leitlinienprogramm
Onkologie

Leitlinie (Langversion)

DKG
KREBSGESELLSCHAFT

Deutsche Krebshilfe
HELLEN. FORSCHEN. INFORMIEREN.

AWMF

... entfernen Sie den GIST..

vollständig

ohne Perforation

möglichst mit
Sicherheitsabstand

Vielen Dank!